

附件 5

# 黑热病防治项目工作方案

(2026 年版)

近年来，我国黑热病流行范围逐年扩大，局部地区出现聚集性疫情。为有效控制疫情复燃，规范黑热病防治项目县各项工作，特制定本方案。

## 一、目的

针对黑热病疫情及其潜在传播风险，因地制宜采取干预措施，及时有效控制疫情。

## 二、项目范围与任务

根据疫情现状，在河北、山西等 9 个省份及新疆生产建设兵团的 50 个县（市、区）设立防治项目，同时在河北、山西等 6 个省份的 20 个县（市、区）设立全健康干预试点。防治项目和全健康干预试点均以县（市、区）为基本单位，具体名单见附表 1 和附表 2。

## 三、项目内容与措施

在监测基础上，防控项目总体实行“及时发现和救治患者、传染源和媒介控制相结合”的综合防控策略，落实监测、传染源控制、媒介控制、健康教育等防治措施，重点做好病例查治、传染源控制、媒介控制、健康教育以及防控能力建设等工作。

### （一）防治项目。

#### 1. 监测

### （1）病例监测和报告

通过医疗卫生机构接诊等途径开展被动监测。发现病例后，须在 24 小时内通过中国疾控中心传染病报告信息系统完成网络直报，县级疾控机构应在 7 日内完成个案调查。

### （2）人群监测

监测对象为出现长期不规则发热等临床症状者。县级疾控机构通过哨点医院采集发热门诊患者血样，送省级疾控机构进行利什曼原虫 PCR 检测。省级疾控机构将阳性样本送中国疾控中心寄生虫病所复核。

### （3）宿主（犬）监测

县级疾控机构应在近 5 年有本地感染病例的村或周边村庄，随机采集 50 份犬血，送省级疾控机构进行利什曼原虫 PCR 检测。省级疾控机构将阳性样本送中国疾控中心寄生虫病所复核。

### （4）媒介监测

县级疾控机构应在近 5 年发病率较高的自然村，选择至少 3 类生境开展媒介监测。犬源型黑热病流行区所选监测村应与宿主犬监测村一致。采集样本送省级疾控机构进行利什曼原虫 PCR 检测，省级疾控机构将阳性样本送中国疾控中心寄生虫病所复核。

## 2.防治措施。

### （1）传染源控制

人源型黑热病项目县：传播季节前后各开展 1 次重点乡镇高危人群病例筛查，对发现的疑似病例及时予以诊治。

野生动物源型黑热病项目县：每年开展野生动物传染源调查，

及时发现并控制传染源。

犬源型黑热病项目县：采用血清学检测法，对当年出现病例的自然村开展病犬筛查，发现的阳性病犬予以无害化处理。

## （2）媒介防制

人源型黑热病项目县：传播季节来临前，由县级疾控机构以上年度病家为中心开展杀虫剂滞留喷洒。

野生动物源型黑热病项目县：传播季节来临前，向重点流行乡镇高危人群发放长效蚊帐。

犬源型黑热病项目县：传播季节来临前，对重点流行乡镇犬只实施驱蛉措施，覆盖率须达 80%以上。

## （3）疫点处置

对于当年发现本地确诊病例或临床诊断病例的村庄，县级疾控机构应及时开展病例筛查、媒介消杀和健康教育等工作。犬源型黑热病病村还需同步开展病犬筛查及无害化处理。

## （4）健康教育

充分利用广播、电视、互联网、移动客户端、宣传栏等多种载体，广泛普及卫生与健康知识，确保黑热病防控宣传覆盖所有项目县。

## （5）能力建设

各项目县每年应组织对疾控和医疗机构相关人员开展黑热病防治知识与技能培训。

## （二）全健康干预试点。

### 1. 监测

同防治项目。

## 2.防治措施

高发病干预点：传播季节来临前（5—6月），对试点县内近5年有病例报告的乡镇开展犬只检测。检测出的阳性病犬予以无害化处理；阴性犬只佩戴驱蛉项圈，佩戴率须达90%以上。

中低发病干预点：传播季节来临前（5—6月），对试点县内近3年有病例报告的乡镇开展犬只检测。检测出的阳性病犬予以无害化处理；阴性犬只佩戴驱蛉项圈，佩戴率须达90%以上。

其它防治措施同防治项目。

### （三）信息管理。

规范采集、登记、存储、整理与归档项目疫情数据及防治工作信息，强化信息分析与利用，为提升防治效率、优化防控措施提供科学依据。

## 四、质量控制

省级疾控机构负责本辖区项目组织实施与技术指导，及时上报并寄送需中国疾控中心寄生虫病所复核的样本。县级防治机构应将项目工作纳入常规业务，列入年度工作计划，配备技术骨干，保持队伍相对稳定，确保工作质量。

## 五、绩效评价

### （一）评价办法。

1.各级疾控、财政部门应加强项目组织管理，严格按项目要求和技术规范推进落实。每项工作完成后，及时开展总结与评估。

2.各地应强化项目管理，压实责任，严格按照项目方案组织

实施，定期对项目执行进度和完成质量进行评估。

3. 项目工作完成后，省级疾控部门应会同财政部门，及时将项目总结报送国家疾控局。国家疾控局将适时会同有关部门，对项目资金使用、执行进度及实施效果等进行专项评估。

## （二）绩效评价。

国家疾控局组织指导中国疾控中心寄生虫病所，定期汇总分析各省工作进度及资料管理情况，并对相关绩效指标开展调查评估。项目绩效指标如下：

1. 黑热病防治项目点数量；
2. 黑热病全健康干预试点数量。
3. 中转项目经费执行率。

附表 1

黑热病防治项目县名单

| 流行类型   | 省（自治区、直辖市） | 县（市、区） |
|--------|------------|--------|
| 人源型    | 新疆维吾尔自治区   | 喀什市    |
| 野生动物源型 | 内蒙古自治区     | 额济纳旗   |
|        | 新疆维吾尔自治区   | 伽师县    |
|        | 新疆生产建设兵团   | 第三师    |
| 犬源型    | 北京市        | 门头沟区   |
|        |            | 昌平区    |
|        |            | 延庆区    |
|        | 河北省        | 井陘县    |
|        |            | 井陘矿区   |
|        |            | 信都区    |
|        |            | 唐县     |
|        |            | 曲阳县    |
|        | 山西省        | 阳泉郊区   |
|        |            | 平定县    |
|        |            | 阳泉城区   |
|        |            | 盂县     |
|        |            | 阳泉矿区   |
|        |            | 襄垣县    |
|        |            | 潞城区    |
|        |            | 潞州区    |
|        |            | 武乡县    |
|        |            | 高平市    |
|        |            | 昔阳县    |
|        |            | 榆次区    |

|  |     |      |
|--|-----|------|
|  |     | 河津市  |
|  |     | 文水县  |
|  |     | 乡宁县  |
|  |     | 襄汾县  |
|  |     | 浮山县  |
|  |     | 曲沃县  |
|  |     | 尧都区  |
|  | 河南省 | 林州市  |
|  |     | 荥阳市  |
|  |     | 巩义市  |
|  |     | 登封市  |
|  |     | 孟津区  |
|  |     | 龙安区  |
|  |     | 偃师区  |
|  |     | 新安县  |
|  |     | 淇滨区  |
|  |     | 新密市  |
|  | 四川省 | 九寨沟县 |
|  |     | 汶川县  |
|  |     | 理县   |
|  | 陕西省 | 韩城市  |
|  |     | 宜川县  |
|  |     | 华州区  |
|  | 甘肃省 | 武都区  |
|  |     | 宕昌县  |
|  |     | 舟曲县  |

附表 2

黑热病全健康干预试点名单

| 省（市、自治区） | 高发干预点县（市、区）        | 复燃中低发病干预点   |
|----------|--------------------|-------------|
| 北京市      | /                  | 房山区         |
| 河北省      | 井陉矿区、曲阳县           | 平山县、临城县     |
| 山西省      | 平定县、浮山县、襄汾县、<br>孟县 | 沁县、屯留县、上党县  |
| 河南省      | 登封市、新密市            | 禹州市、殷都区、洛宁县 |
| 陕西省      | 韩城市                | 澄城县         |
| 甘肃省      | 舟曲县                |             |